

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種をご希望の方へ

肺炎の主要な原因である
肺炎球菌の感染症を予防できるワクチン
があります！

1　肺炎球菌について

○肺炎は日本の死亡原因の第５位であり、成人の肺炎の２～３割は、肺炎球菌という主に気道の分泌物に含まれる細菌細菌により、咳やくしゃみなどを通じて引き起こされるとの報告があります。加齢や体調を崩すなどして免疫力が低下すると、もともと体内にいた肺炎球菌が肺炎を起こしやすくなります。

○肺炎球菌は、このほかにも血液中に細菌が回ってしまう敗血症（はいけつしょう）などの重い感染症の原因になることがあります。

2　接種対象となる方と使用するワクチン



接種時において、久万高原町に住民票のある６５歳の方

※接種時に 60～64 歳で心臓、じん臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫低下の重度障がい（身体障害者手帳 1 級相当）を有する人

定期接種で使用するワクチン

沈降 20 価肺炎球菌結合型ワクチン（プレベナー20）

3　ワクチンの効果



肺炎球菌には 100 種類以上の血清型があり、使用するワクチンにより効果が異なります。肺炎球菌による感染症に対して、すべての肺炎などが防げるわけではありませんが、有効性・安全性が確認されており、接種することによって、発症予防・重症化防止などの効果が期待されます。

沈降 20 価肺炎球菌結合型ワクチン（プレベナー20）	○ 20 種類の血清型を対象 ○ この 20 種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約５～６割を占める ○ 血清型に依らないの侵襲性肺炎球菌感染症を約３～４割程度予防する効果がある

（※）侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。

4　実施期間：６５歳の誕生日の前日～６６歳の誕生日の前日まで



5　ワクチンの副反応

主な副反応としては、接種部位の症状（痛み、赤み、腫れ）、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがみられることがありますが、いずれも軽度で 2～3 日で治ります。ただ、過去にこのワクチンを受けた方が、短い期間で再接種することで、副反応が強く出る場合があるので、注意が必要です。

接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。

裏面に続きます！！

● 予防接種を受けることができない方



① 明らかに発熱している人（通常は 37.5℃を超える場合）
② 重い急性疾患にかかっている人
③ ワクチン接種後約 30 分以内にひどいアレルギー反応をおこしたことがある人
④ その他、かかりつけ医や医師から予防接種を受けないほうがよいと言われた人

● 予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人

① 心臓病、じん臓病、肝臓病、血液やその他の慢性疾患で治療を受けている人
② 過去に予防接種で接種後２日以内に発熱、全身性発しんなどのアレルギーを疑う症状のみられた人
③ 過去にけいれん（ひきつけ）をおこしたことがある人
④ 免疫不全の診断がされている人及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
⑤ 接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある人

● ワクチン接種後の注意

① 接種後 30 分間は、ショック等がおこることがありますので安静にし、医師とすぐ連絡がとれるようにしておきましょう。
② 接種後 24 時間は、特に体調に注意しましょう。高熱やけいれんなどを起こした場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
③ 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は問題ありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
④ 接種当日は激しい運動はさけましょう。

●【重要】健康被害に対する救済制度について

予防接種を受けたことによって健康被害（疾病や障がいなど）が生じたと厚生労働省が認定した場合、町はその健康被害に関する医療費医療手当て等の給付を行います。



＜久万高原町内の医療機関＞

医療機関名	電話番号	医療機関名	電話番号
久万高原町立病院	２１－１１２０	畑野川クリニック	４１－００２０
うつのみや内科	２１－３３５３	柳谷診療所（旧：吉村医院）	５４－２０５０
父二峰診療所	２１－１６３７	みかわクリニック	５６－０９０８
直瀬クリニック	３１－００１１	面河診療所	５８－２０１６



詳しいお問い合わせ・ご相談は、久万高原町　保健センター
☎　０８９２－２１－２７００